

## COBERTURA BAJO LA LEY DE ATENCIÓN ASEQUIBLE (AFFORDABLE CARE ACT)

Todos los planes de seguros (planes del mercado de intercambio de seguros) obtenidos a través de la Ley de atención asequible (Affordable Care Act) y la mayoría de los otros planes deben cubrir los siguientes servicios preventivos. Los planes deben cubrir estos servicios sin cobrarle a usted copagos o seguro compartido. Esto se aplica aun cuando usted no haya completado su deducible anual y solo cuando estos servicios los proporciona un proveedor dentro de la red. Para obtener más información, visite [www.healthcare.gov](http://www.healthcare.gov).

Servicios Preventivos de Salud Sexual	Cobertura bajo la ley de atención asequible (Affordable Care Act)
<b>Prueba de detección de cáncer cérvicouterino (cáncer de cuello uterino)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mujeres entre 21 y 29 años, prueba de Papanicolaou cada 3 años.</li> <li>Mujeres entre 30 y 65, realizar una prueba de control cada 3 a 5 años según la recomendación de su profesional de la salud.</li> </ul>
<b>Prueba de detección de clamidia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba anual para mujeres de 24 años o menos, sexualmente activas, incluidas las que están embarazadas.</li> <li>Anualmente para mujeres de 25 años o más que están en riesgo, incluidas las que están embarazadas.</li> </ul>
<b>Asesoramiento sobre anticoncepción y métodos anticonceptivos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mujeres en edad reproductiva. Incluye educación para pacientes y asesoramiento, métodos anticonceptivos aprobados por la FDA y procedimientos de esterilización.</li> </ul>
<b>Prueba de detección de gonorrea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba anual para mujeres de 24 años o menos, sexualmente activas, incluidas las que están embarazadas.</li> <li>Anualmente para mujeres de 25 años o más que están en riesgo, incluidas las que están embarazadas.</li> </ul>
<b>Prueba de detección de gonorrea</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba anual para mujeres de 24 años o menos, sexualmente activas, incluidas las que están embarazadas.</li> <li>Anualmente para mujeres de 25 años o más que están en riesgo, incluidas las que están embarazadas.</li> </ul>
<b>Vacuna contra la hepatitis A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los niños a partir de los 12 meses.</li> <li>Otras poblaciones recomendadas.</li> </ul>
<b>Vacuna contra la hepatitis B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los bebés, comenzando con la primera dosis al nacer.</li> <li>Todos los niños y adolescentes menores de 19 años que no fueron vacunados al nacer.</li> <li>Otras poblaciones recomendadas.</li> </ul>
<b>Prueba de detección de hepatitis B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para todas las personas en riesgo.</li> <li>Mujeres embarazadas en la primera visita prenatal.</li> </ul>
<b>Prueba de detección de hepatitis C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adultos en riesgo.</li> <li>Realizar una prueba a adultos nacidos entre 1945 y 1965.</li> </ul>
<b>Prueba de detección del VIH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las personas entre 15 y 65 años deben hacerse la prueba por lo menos una vez.</li> <li>Los que están en riesgo deben hacerse la prueba con más frecuencia.</li> <li>Mujeres embarazadas.</li> </ul>
<b>Vacuna contra el VPH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una serie de dos dosis para niñas de 11-12 años y una serie de tres dosis para mujeres entre 15 y 26 años que no fueron vacunadas a una edad más temprana.</li> <li>Una serie de dos dosis para niños de 11-12 años y una serie de tres dosis para varones de 15 a 21 años que no fueron vacunados a una edad más temprana. También puede ser aplicada a varones de 22 a 26 años; consulte a su profesional de la salud.</li> </ul>

## Servicios Preventivos de Salud Sexual

## Cobertura bajo la ley de atención asequible (Affordable Care Act)

<b>Infecciones de transmisión sexual (STI): Asesoramiento de conducta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Todos los adolescentes sexualmente activos.</li><li>• Todos los adolescentes sexualmente activos.</li></ul>
<b>Prueba de detección de sífilis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Todas las mujeres embarazadas.</li><li>• Adolescentes y adultos en riesgo.</li></ul>

\*\* Usted se encuentra en riesgo si tiene sexo vaginal, anal u oral sin protección (relaciones sexuales sin condón), tiene múltiples parejas sexuales, tiene una STI (incluyendo VIH), comparte el equipo para la inyección de drogas (lo que incluye agujas y jeringas) o tiene sexo a cambio de drogas o dinero. También se encuentra en riesgo si tiene una pareja que presenta cualquiera de estas conductas o desconoce el historial de salud de su pareja.